



## Pauta posológica dividida en 2 días

Si empieza a tomar PLENVU® la noche antes de su colonoscopia, aquí le explicamos cómo prepararse

Fecha de la colonoscopia: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Lugar de la colonoscopia: \_\_\_\_\_

Hora de la colonoscopia: \_\_\_\_\_ No se debe beber nada después de: \_\_\_\_\_

### NOCHE

#### Dosis 1 de PLENVU®:

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Día de la semana: L M X J V S D

Hora: \_\_\_\_\_

### MAÑANA

#### Dosis 2 de PLENVU®:

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Día de la semana: L M X J V S D

Hora: \_\_\_\_\_

**NOCHE**

**DOSIS 1**

16 oz (473 ml) | 16 oz (473 ml)

SABOR A MANGO

**MAÑANA**

**DOSIS 2**

16 oz (473 ml) | 16 oz (473 ml)

SABOR A ZUMO DE FRUTAS

ESPERE APROXIMADAMENTE **12 HORAS** DESDE EL COMIENZO DE LA DOSIS 1

LISTO PARA EL PROCEDIMIENTO

Nota: la solución real es clara.

**Deje de beber líquidos al menos 2 horas antes de la colonoscopia** o según lo recomendado por su proveedor de asistencia sanitaria.



### TOME LA DOSIS 1

1. Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido del sobre de la dosis 1 con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de agua agitándolo todo o usando una cuchara hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar de 2 a 3 minutos. Tómese su tiempo: termine lentamente la dosis en 30 minutos.
2. Vuelva a llenar el recipiente con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de líquido transparente. De nuevo, tómese su tiempo y térmelo lentamente en 30 minutos.

### ESPERE APROXIMADAMENTE 12 HORAS DESDE EL COMIENZO DE LA DOSIS 1, Y ENTONCES...

### TOME LA DOSIS 2

1. Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la dosis 2 (sobre A y sobre B) con al menos 473 ml de agua agitándolo o usando una cuchara hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar de 2 a 3 minutos. Tómese su tiempo: termine lentamente la dosis en 30 minutos.
2. Vuelva a llenar el recipiente con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de líquido transparente. De nuevo, tómese su tiempo y térmelo lentamente en 30 minutos.

**CONSEJO ÚTIL: PLENVU® puede refrigerarse. Úselo en las 6 horas posteriores a mezclarlo con agua.**

### INDICACIÓN

PLENVU® (polietilenglicol 3350, ascorbato de sodio, sulfato de sodio, ácido ascórbico, cloruro de sodio y cloruro de potasio para solución oral) es un medicamento recetado que los adultos usan para limpiar el colon antes de una colonoscopia.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- No tome PLENVU® si tiene un bloqueo en su intestino (obstrucción

intestinal), una abertura en la pared del estómago o el intestino (perforación intestinal), problemas con el vaciado de alimentos o líquidos del estómago (retención gástrica), un problema de desplazamiento demasiado lento de la comida a través de sus intestinos (íleo), un intestino grueso muy dilatado o alergia a alguno de los ingredientes de PLENVU®.

**Consulte la información importante de seguridad adicional de la parte posterior y toda la información de prescripción adjunta, que incluye la guía de medicamentos y las instrucciones de uso.**

# Manténgase hidratado/a para que la preparación tenga éxito

## Es importante mantenerse hidratado/a antes, durante y después de la ingesta de PLENVU®.

No es necesario que beba solo agua; puede optar por líquidos claros. Algunos ejemplos de líquidos claros son estos:

- Gaseosa clara
- Sopas claras de caldo
- Limonada o bebida de lima filtrada
- Gelatina (sin frutas ni coberturas)
- Bebidas energéticas
- Zumo de fruta claro diluido (sin pulpa)
- Café/té (sin leche)
- Polos (sin trozos de fruta ni pulpa)

**No tome alcohol, leche, líquidos de color rojo o morado ni nada que contenga pulpa.**

**Deje de beber líquidos al menos 2 horas antes de la colonoscopia** o según lo recomendado por su proveedor de asistencia sanitaria.

Para obtener más información sobre **PLENVU®**,  
visite **myPLENVU.com** o llame a nuestra línea gratuita  
de 24 horas al teléfono **1-855-MY-PLENVU**

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Es importante beber suficiente líquido claro antes, durante y después del uso de PLENVU®. Asegúrese de consumir otros líquidos claros después de la primera dosis y la segunda dosis de PLENVU®. Deje de beber líquidos 2 horas antes de la colonoscopia.
- Antes de tomar PLENVU®, hable con su médico si:
  - Tiene problemas con la pérdida grave de líquidos corporales (deshidratación) y cambios en las sales de la sangre (electrolitos).
  - Tiene problemas cardíacos o toma medicamentos que afecten al corazón. Su médico puede plantearse hacer un electrocardiograma (ECG) si tiene un mayor riesgo de anomalías en el ritmo cardíaco.
  - Tiene un historial de convulsiones o toma medicamentos anticonvulsivos.
  - Tiene problemas renales o toma medicamentos que afecten a la función renal. Es posible que su médico quiera realizar análisis de sangre antes y después de la colonoscopia.
  - Tiene antecedentes de problemas estomacales o intestinales, como colitis ulcerativa, bloqueo intestinal o una posible abertura en la pared del estómago o el intestino.
  - Tiene problemas para tragar, acidez estomacal (reflujo gástrico) o si inhala alimentos o líquidos en sus pulmones al comer o beber (aspirar).
  - Sufre una afección que destruye los glóbulos rojos, llamada deficiencia de 6-fosfato de glucosa deshidrogenasa (G6PD).
  - Está dejando el alcohol.
  - Tiene fenilcetonuria (PKU). PLENVU® contiene aspartamo equivalente a 491 mg de fenilalanina por cada tratamiento.

- Está embarazada o planea quedarse embarazada.
- Está amamantando o planea amamantar.
- PLENVU® puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos. Antes de tomar PLENVU®, informe a su médico de todos los demás medicamentos (incluidos los medicamentos con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas) que tome. No tome medicamentos por vía oral en la hora anterior o posterior al inicio de cada dosis de PLENVU®.
- Los síntomas de reacciones alérgicas graves pueden incluir erupción cutánea, picazón, manchas rojas hinchadas en la piel (urticaria), hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la garganta, y problemas renales.
- En estudios clínicos con PLENVU®, los efectos secundarios más frecuentes en pacientes que tomaban PLENVU® fueron náuseas, vómitos, deshidratación y dolor/malestar abdominal.

Se recomienda informar a la FDA de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

Para obtener información sobre productos, informes de eventos adversos e informes de quejas de productos, póngase en contacto con:

Salix Product Information Call Center

Teléfono: 1-800-321-4576

Fax: 1-510-595-8183

Correo electrónico: [salixmc@dls.com](mailto:salixmc@dls.com)

**Consulte la información importante de seguridad adicional de la parte delantera y toda la información de prescripción adjunta, que incluye la guía de medicamentos y las instrucciones de uso.**